

---

# 延胡索(元胡)

Yanhusuo

## CORYDALIS RHIZOMA

**【检查】水分** 不得过 15.0% (通则 0832 第二法)。

**总灰分** 不得过 4.0% (通则 2302)。

**黄曲霉毒素** 照真菌毒素测定法 (通则 2351) 中黄曲霉毒素测定法第一法测定。

供试品溶液的制备 取供试品粉末约 5g, 精密称定, 置于均质瓶中, 加入氯化钠 1g, 精密加入 70% 甲醇溶液 75ml, 高速振荡 5 分钟, 离心 10 分钟 (离心速度 8000 转 / 分钟), 精密量取上清液 15ml, 置 100ml 量瓶中, 用水稀释至刻度, 摇匀, 离心 10 分钟 (离心速度 8000 转 / 分钟), 精密量取上清液 20ml, 通过免疫亲和柱, 流速每分钟 3ml, 用水 10~20ml 洗脱, 弃去水洗液, 使空气进入柱子, 将水挤出柱子, 再用 1.5ml 甲醇洗脱, 收集洗脱液, 置 2ml 量瓶中, 并用水稀释至刻度, 摇匀, 即得。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 不得过 5 $\mu$ g, 含黄曲霉毒素 G<sub>2</sub>、黄曲霉毒素 G<sub>1</sub>、黄曲霉毒素 B<sub>2</sub>、黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 的总量不得过 10 $\mu$ g。