

## 白屈菜

**【鉴别】** (1) 本品粉末绿褐色或黄褐色。~~纤维多成束，细长，两端平截，直径25~40 $\mu$ m，壁薄。导管多为网纹导管、梯纹导管及螺纹导管，直径25~45 $\mu$ m。~~叶上表皮细胞多角形；叶下表皮细胞壁波状弯曲，气孔为不定式。乳汁管碎片长条形，含黄棕色分泌物。非腺毛由1~10余个细胞组成，表面有细密的疣状突起，顶端细胞较尖，中部常有一至数个细胞缢缩。花粉粒类球形，直径20~38 $\mu$ m，表面具细密的点状纹理，具3个萌发孔。果皮表皮细胞长方形或梭形，长60~100 $\mu$ m，宽25~40 $\mu$ m，有的细胞中含草酸钙方晶，细胞壁呈连珠状增厚。~~淀粉粒单粒，直径3~10 $\mu$ m；复粒由2~10分粒组成。~~

(注：白屈菜饮片性状增订的公示，参见

<http://www.chp.org.cn/view/ff8080816c69cb52016c6b3f780a027e?a=BZZY>。)

---

起草单位： 中国药科大学  
复核单位： 河北省药品检验研究院  
主要起草人： 李萍，杨华  
联系方式： 13770618735，104yang104@163.com