

羊外肾（羊睾丸） ལྷག་གི་རླིག་འབྲས་

Yangwaishen

TESTIS CAPRAE SEU OVIS

DYB63-QHZYC001-2022

本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L.或绵羊 *Ovis aries* L.的干燥睾丸。全年皆产，将羊宰杀，割取睾丸，干燥或晾干。

【性状】本品呈卵圆形、椭圆形，淡棕色至棕色，略有光泽，多皱缩，长2~4cm，宽1~2.8cm，质硬，不易折断，气腥，具羊膻气，味微咸。

【鉴别】（1）取本品粉末2g，加水10ml振摇5分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

①取滤液1ml，加茛三酮试液0.5ml，置水浴上加热15分钟，溶液显蓝紫色。

②取滤液1ml，加新制的1%硫酸铜溶液和10%氢氧化钠溶液（1:1）混合溶液数滴，振摇，溶液显紫红色。

（2）取本品粗粉0.1g，置具塞试管中，加6mol/L盐酸溶液2ml，密塞，置沸水浴中煮沸1小时，取出，加水1ml，摇匀，滤过，用少量水洗涤滤器及滤渣，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取精氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的混合溶液，作为对照品溶液，照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述两种溶液各3~5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（5:1:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茛三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 照水分测定法(《中国药典》四部通则 0832 第二法)测定,不得过 10.0%。

总灰分 照总灰分测定法(《中国药典》四部通则 2302)测定,不得过 6.5%。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》四部通则 2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于 18.0%。

饮片

【炮制】奶制 取原药材,除去杂质,置牛奶中浸没,煎煮,至牛奶煮干后,取出晾干,即得。

【性状】本品呈卵圆形、椭圆形,直径 1.5~3.5cm,表面褐色,多皱缩。质硬,气腥。

【鉴别】同药材。

【检查】水分 同药材,不得过 10.0%。

总灰分 同药材,不得过 6.5%。

【浸出物】同药材,不得少于 18.0%。

羊睾丸粉 取新鲜羊睾丸,洗净,切成小块,加姜汁腌制,取出,加盐水及黄酒煎煮,取出,干燥,粉碎成粗粉。

【性状】本品呈黄白色至浅黄棕色粉末或小颗粒,气微腥,味咸。

【鉴别】同药材。

【检查】水分 同药材,不得过 10.0%。

总灰分 同药材,不得过 6.5%。

【浸出物】同药材,不得少于 18.0%。

【性味与归经】性,温、甘、咸。归肾经。

【功能与主治】补肾气,益精髓,壮阳。用于肾虚腰痛,足膝痿弱,

阳痿、遗精、滑泄、带下，小便频数，睾丸肿痛等症。

མཁལ་མའི་རྩོད་ཤོར་མཁལ་གཙོང་འོར་ལྷུང་དང་། ཟུངས་སྟོབས་ཟད་དང་ཚིག་འབྲས་སྟོས་ཤིང་གཟེར། །
རོ་ཙ་ཉམས་དང་ས་བོན་འཇག་ཅིང་ཤོར། ། ལུ་སི་ཙ་འབྲམས་སོགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་མད།

【用法与用量】1~3g。口服或入丸、散剂。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。