

一、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯

氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯属拟除虫菊酯类农药，适用防治棉花、花生、大豆、果树、蔬菜、烟草上多种害虫、害螨，也可用于防治多种地表和公共卫生害虫。

二、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）

土霉素、金霉素、四环素都属于四环素类抗生素，具有抑制细菌生长繁殖的作用，在农业和畜牧业中常被用于预防和治疗动物感染性疾病。少量的残留一般不会引起人体急性中毒，但长期食用土霉素、金霉素、四环素超标的食品，对人体健康可能有一定影响，如破坏肠道菌群平衡、导致细菌产生耐药性、影响儿童生长发育等。土霉素、金霉素、四环素残留量超标的原因，可能是为快速控制动物疾病，加大用药量或未遵守休药期规定，致使上市销售的食品中残留量超标。

三、噻虫嗪

噻虫嗪是烟碱类杀虫剂，具有胃毒、触杀和内吸作用，对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒，但长期食用噻虫嗪超标的食品，对人体健康可能有一定影响。噻虫嗪残留量超标的原因，可能是为快速控制虫害，加大用药量或未遵守采摘间隔期规定，致使上市销售的产品中残留量超标。

四、噻虫胺

噻虫胺，是新烟碱类杀虫剂，具有触杀、胃毒作用，具有根内吸活性和层间传导性。用于水稻、玉米、油菜、果树及其他作物上的刺吸式和咀嚼式害虫，如蚜虫、飞虱等。急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、躁动、抽搐等。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒，但长期食用噻虫胺超标的食品，对身体健康也有一定影响。

五、苯醚甲环唑

苯醚甲环唑又称恶醚唑，是低毒杂环类杀菌剂农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定柑、橘的苯醚甲环唑最大残留限量为 0.2mg/kg。农产品中苯醚甲环唑残留量超标，可能为种植者未严格按照规定用量使用，或者使用后未严格落实农药使用后安全间隔期有关规定而导致。